

Cómo colocar un preservativo

1. Abrilo con cuidado.
2. Ponelo sobre el pene erecto, apretando la punta para que no quede aire.
3. Desenrollalo totalmente hacia atrás. Cuando termines, sacalo antes de perder la erección.



Cómo hacer un campo de látex



1. Abrilo y desenrollalo. Sacale el borde superior con los pulgares.
2. Rompelo a lo largo y abrílo.
3. Estíralo con el índice y el pulgar para armar el campo de látex.

INFORMATE LLAMANDO AL
0800-3333-444
www.msal.gov.ar/sida

¿Cómo saber si tenés una ITS?

Las ITS pueden provocar lastimaduras en la zona genital (que duelen o no), secreciones de pus en los genitales (vagina o pene), ardor al orinar, flujo genital diferente al habitual, dolor en la parte baja del abdomen.

Algunas ITS pueden no dar síntomas, como el VIH o la hepatitis B, que solo se detectan con un análisis.

A veces, los síntomas desaparecen en pocos días, pero eso no significa que te curaste.



Las ITS son tratables y muchas de ellas se curan.

Si tenés dudas consultá en un hospital o centro de salud.



Dirección de Sida y ETS



Ministerio de Salud
 Presidencia de la Nación

¿Qué son las ITS?

Son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual vaginal, anal u oral.

Las más frecuentes son la sífilis, gonorrea, clamidiasis, herpes, hepatitis B y C, VIH y VPH.



Si no son tratadas, las ITS pueden producir:

- infertilidad
- discapacidad
- cáncer de cuello uterino
- problemas durante el embarazo, entre otras consecuencias.

¿Cómo se previenen?



La mayoría de las ITS se pueden prevenir usando preservativo desde el comienzo de la relación sexual.

En el caso de la hepatitis B, existe una vacuna efectiva para prevenir esta infección que está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación.



Si estás embarazada, es importante que vos y tu pareja se realicen los análisis porque podés evitar la transmisión al bebé.

