

# Algoritmo para el SOPORTE VITAL BÁSICO

## DE ADOLESCENTES Y ADULTOS/AS

**Confirmar la seguridad de la escena.**

**Paciente sin movimiento ni respuesta:**

Pedir ayuda en voz alta y activar el SE, (celular) y buscar un desfibrilador o DEA o indicar a otra persona que lo traiga.

**Comprobar que no respira o jadea, comprobar pulso**  
¿existe pulso palpable dentro de los 10 seg?

**Pulso palpable**  
**Respira normal**

Controlar hasta que llegue el SE.

**Sin respiración**  
**Sin pulso**

**RCP:** 30 compresiones y 2 ventilaciones.  
Usar el DEA tan pronto como sea posible.  
Ritmo: 100-120/min.

**Pulso palpable**  
**No respira**

- Administrar 1 ventilación c/6 seg.
  - Activar el SE (si no se hizo antes) al cabo de 2 minutos.
- Verificar el pulso cada 2 min.\**

**DEA disponible**

**Comprobar ritmo.**  
¿El ritmo es desfibrilable?

**SI**

**NO**

**Dar 1 descarga**

- Retomar RCP inmediatamente por 2 minutos y reevaluar pulso y ritmo con el DEA.
- Continuar RCP hasta que llegue el SE o ESVA o la víctima comience a moverse.

**Retomar RCP inmediatamente por 2 min**

- Comprobar pulso y ritmo con el DEA cada 2 min.
- Continuar RCP hasta que llegue el SE o ESVA o la víctima comience a moverse.

*\* En caso de sospecha de sobredosis de opiáceos administrar naloxona 0.1mg/kg EV/IM.*

**SE:** Sistema de emergencias

**ESVA:** Equipo de soporte vital avanzado

**SVA:** Soporte vital avanzado