

RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AMARILLA, SARAMPIÓN Y RUBÉOLA PARA RESIDENTES Y CONTEXTO DE VIAJE

5 de diciembre de 2023



Ministerio de Salud
Argentina

En Argentina, no se registran casos de sarampión, rubéola, poliomielitis y fiebre amarilla pero si la persona es susceptible puede tener riesgo de contraerlas al viajar a aquellos países donde no hayan sido eliminadas aún. Por esto, en contexto de viaje, es importante que las personas en todas las etapas de la vida cuenten con esquemas completos de las vacunas del Calendario Nacional, así como la vacuna contra COVID-19.

Es importante consultar con antelación a un/a profesional de la salud previo a un viaje para revisar el itinerario y recomendaciones que incluyan chequear el carnet y, si es necesario, aplicar las vacunas para que el sistema inmune pueda generar la respuesta y llegar protegidos/as al lugar de destino.

RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AMARILLA

Recientemente se confirmó el fallecimiento de monos por fiebre amarilla en los municipios del estado de Río Grande (Brasil) fronterizos con los departamentos de Corrientes y Misiones.¹ Esto señala la presencia de mosquitos infectados con el virus y el consiguiente riesgo para personas que residan o visiten esos lugares.

Ante la proximidad de las vacaciones de verano, se recomienda la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para personas que residan o visiten esos lugares y reforzar las acciones de prevención.

Según lo establecido por la Ley 27.491, cada dosis deberá ser asentada en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) para ser visualizada a través de la aplicación Mi Argentina, y a toda persona vacunada, se le deberá emitir el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla.

Estrategias de vacunación

La vacuna contra la fiebre amarilla ha probado ser efectiva y segura. Existen precauciones y contraindicaciones para su uso. La vacuna puede administrarse en forma simultánea con otras vacunas.


Para más información podés ingresar a <https://www.argentina.gob.ar/salud/febreamarilla> y hacer el test para evaluar la indicación de la vacuna.

¹ Governo do estado do Rio Grande Do Sul. Secretaria da Saúde alerta para nova circulação da febre amarela em macacos no Estado. Página Web. Noviembre de 2023 (Recuperado el 04 de diciembre de 2023). Disponible en: <https://estado.rs.gov.br/secretaria-da-saude-alerta-para-nova-circulacao-da-febre-amarela-em-macacos-no-estado>

☞ Vacunación para personas que residen en zonas de nuestro país con riesgo de circulación viral de fiebre amarilla

El Calendario Nacional contempla la vacunación de personas que residen en **zonas con riesgo de circulación viral de fiebre amarilla**:

Provincia	Departamentos
Formosa	Todos
Misiones	
Corrientes	
Jujuy	Ledesma, Santa Bárbara, San Pedro, Valle Grande
Salta	General José de San Martín, Orán, Rivadavia, Anta
Chaco	Bermejo



Esquemas recomendados según grupo de edad son:

Personas menores de 2 años (24 meses)	Esquema de dos dosis <ul style="list-style-type: none"> - Primera dosis: entre los 12 y 18 meses - Dosis de refuerzo: a los 11 años
Personas de 2 a 59 años, sin dosis anteriores	Esquema de dosis única

Es fundamental que las personas que trabajen en ámbitos rurales, parques nacionales y provinciales, personal de salud, transportistas, fuerzas de seguridad y cualquier otra persona que por su actividad laboral pueda entrar en contacto con el virus, se encuentren vacunadas.

☞ Vacunación para personas que viajan a zonas con transmisión comprobada de fiebre amarilla

Se recomienda la vacunación a personas que viajan a **zonas con transmisión comprobada de fiebre amarilla** o por **requerimiento del país de destino**.

En nuestro país, también se recomienda la vacunación en caso de viaje a las provincias o departamentos señalados previamente como **zona de riesgo de circulación viral de fiebre amarilla**.

La vacuna debe ser administrada al menos diez días antes de arribar a destino, a quienes no presenten contraindicaciones o precauciones para recibirla. En estos casos, una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida.

El esquema recomendado en personas que viajan:

Personas de 9 meses a 59 años que no hayan recibido la vacuna previamente	<p>Esquema de dosis única</p> <p>Al menos diez días antes de arribar al destino</p>
---	--

En las personas con riesgo aumentado de efectos adversos potencialmente graves asociados a la vacunación, se recomienda no viajar a destinos con transmisión activa del virus de la fiebre amarilla. Si el viaje fuera impostergable, el equipo de salud deberá evaluar la conveniencia de indicar la vacunación y emitir una orden médica para recibir la vacuna.

Para conocer más sobre qué países requieren la vacuna contra fiebre amarilla, podés ingresar al siguiente link: <https://www.argentina.gob.ar/salud/febreamarilla/zonas-de-riesgo>

Podes encontrar más información ingresando a este link <https://www.argentina.gob.ar/salud/febreamarilla> y hacer el test para evaluar la indicación de la vacuna.

Otras estrategias de prevención

- Evitar las picaduras de los mosquitos mediante la utilización de repelentes, usar vestimenta clara de mangas largas y pantalones largos al ingresar en áreas silvestres. Además, se recomienda el uso de telas mosquiteras en puertas y ventanas para evitar el ingreso de mosquitos a las viviendas. El repelente debe usarse en abundancia y renovar la aplicación periódicamente, en especial, si se estuvo en contacto con agua o si transpira en abundancia.
- Evitar la permanencia en espacios abiertos durante las horas de mayor circulación de mosquitos. Si bien la mayor actividad del mosquito se da durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, también puede picar durante la noche si en la casa hay alguna luz encendida o en otros momentos del día si no se alimentó.
- Reforzar las medidas de protección personal en caso de ingresar en zonas silvestres o áreas naturales protegidas durante el día, momento de mayor actividad de los mosquitos que transmiten fiebre amarilla en el ciclo silvestre.
- Evitar la reproducción del mosquito *Aedes aegypti* que puede transmitir fiebre amarilla eliminando recipientes en desuso que puedan acumular agua, o protegiendo aquellos que no se puedan eliminar (dándolos vuelta o cubriéndolos). Esto debe hacerse durante todo el año ya que, si bien durante los meses de frío los mosquitos adultos reducen su actividad, los huevos son capaces de sobrevivir durante el invierno hasta por un año.
- Recordar que la aplicación de insecticidas es una medida que sólo elimina a los mosquitos adultos pero no a los otros estadios del mosquito (huevos, larvas y pupas). Como este insecticida no tiene efecto residual, si no se eliminan o protegen los contenedores que actúan como potenciales criaderos, a los pocos días habrá nuevamente mosquitos adultos. La fumigación no puede realizarse como medida preventiva.

RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN Y RUBÉOLA

Gracias a la vacunación sostenida, Argentina eliminó la circulación endémica de los virus de sarampión y rubéola. Sin embargo, por la alta circulación en otras regiones, se registraron casos importados. En 2022, 37 países de cuatro regiones de la Organización Mundial de la Salud se vieron afectados por brotes de sarampión. Entre estos brotes de 2022, 28 de 37 (76%) ocurrieron en países de la Región de África, seis (16%) en la Región del Mediterráneo Oriental, dos (5%) en la Región del Sudeste Asiático y uno (3%) en la Región Europea. Hasta octubre de 2023 la región Europea concentró la mayor cantidad de brotes.

Para la prevención de ambas enfermedades se dispone de una vacuna segura y eficaz en el Calendario Nacional de Vacunación de Argentina ya que no existe tratamiento específico para el sarampión ni para la rubéola.

Estrategias de vacunación

🕒 El Calendario Nacional de Vacunación contempla:

- Primera dosis: vacuna triple viral a los 12 meses
- Segunda dosis: vacuna triple viral a los 5 años
- Personas de 5 años o más: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión y la rubéola aplicadas después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.
- Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidas por haber estado en contacto con el virus.
- Personal de salud: Todas las personas que trabajan en el sistema de salud (mesa de entradas, limpieza, seguridad, laboratorio, planta médica y de enfermería, etc.) deben acreditar dos dosis de vacuna contra el sarampión y la rubéola aplicadas después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.

🕒 Vacunación para residentes de Argentina que viajan al exterior

La vacunación es la única medida efectiva para prevenir el sarampión y la rubéola. Si vas a viajar al exterior, asegúrate de que vos y tu familia tengan los esquemas de vacunación completos según la edad.

- Personas de 6 a 11 meses de vida: deben recibir UNA DOSIS de vacuna Doble o Triple Viral. Esta dosis se denomina (“dosis cero”) y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.
- Personas de 12 meses: Deben recibir UNA DOSIS correspondiente al calendario.
- Personas de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna Triple Viral después del año de vida.
- Mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas: deben acreditar DOS DOSIS o más de vacuna con componente contra el sarampión (Doble o Triple Viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión y rubéola (serología IgG+).
- Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse.
- Personas Gestantes: Se recomienda viajar si acreditan al menos DOS DOSIS de vacuna con componente anti sarampiñoso (Doble o Triple Viral) aplicada después del año de

vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión y rubéola (serología IgG+). Se aconseja considerar aplazar y/o reprogramar el viaje en personas gestantes sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión y la rubéola.

- Menores de 6 meses de vida: se recomienda considerar aplazar y/o reprogramar el viaje por no poder recibir la vacuna y ser un grupo de gran vulnerabilidad.

La vacuna contra el sarampión y la rubéola en ocasión de un viaje debe ser aplicada **por lo menos 15 días antes**.

Para más información: <https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion>

*primero
la gente*



argentina.gob.ar/salud