

## Campaña Nacional de Seguimiento (CNS) contra Sarampión y Rubéola 2018



### ¿PARA QUÉ SE REALIZA?

Para que Argentina pueda sostener la eliminación del sarampión, la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita es necesario tener altos porcentajes de población vacunada (coberturas de vacunación).

### ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?

Todos los niños entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días. Es decir, todos los nacidos entre 1/11/2013 y 31/10/2017, independientemente de las dosis recibidas con anterioridad.

### ¿QUÉ VACUNA SE UTILIZARÁ?

La vacuna triple viral que se utiliza habitualmente. Es una dosis adicional, obligatoria y gratuita para reforzar la inmunidad de la comunidad.

### ¿CUÁNDO?

Del 1 de octubre al 30 de noviembre 2018.

### Vigilancia epidemiológica de EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI)

Todo profesional de la salud que asista a una persona con sospecha de un ESAVI, debe notificarlo en el componente ESAVI de la plataforma NOMIVAC-SISA que se accede por el link


<https://sisa.msal.gov.ar/sisa>

Se notifican todos los ESAVI, independientemente de la posible relación causal con la vacuna.

### Vigilancia epidemiológica de ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMÁTICA (EFE)

Todo paciente que presente fiebre de 38° C o más y exantema luego de la vacunación, debe notificarse tanto como ESAVI como caso sospechoso de EFE.

Caso sospechoso:  
Paciente con fiebre y exantema



## Población objetivo

**TODOS LOS NACIDOS ENTRE  
1 DE NOVIEMBRE 2013  
Y 31 DE OCTUBRE 2017**

*No se solicitará orden médica para recibir la dosis de vacuna de campaña.*

**Niños entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días:**  
se aplica vacuna triple viral de campaña.

**Niños que cumplen 12 meses en octubre 2018:**  
se aplica la vacuna triple viral de calendario y se cita en noviembre para aplicar la dosis de correspondiente a la campaña.

**Esquemas atrasados:**  
Niños de 13 meses a 4 años inclusive que no certifiquen la dosis de triple viral del año, se aplica vacuna de campaña y se cita al mes para dosis de calendario.

Niños que cumplen 12 meses en noviembre de 2018 se aplica la vacuna triple viral de calendario por no corresponder a la población de campaña.

## CONTRAINDICACIONES de la vacuna TRIPLE VIRAL

Reacción alérgica grave (anafilaxia) ante una dosis anterior o a componentes de la vacuna (por ejemplo, gelatina, neomicina).

Los niños inmunocomprometidos NO pueden recibir la vacuna SRP:

- Inmunodeficiencia primaria
- Infección por VIH con recuento de CD4 < 15%
- Inmunosupresión por fármacos
- Trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos
- Enfermedad oncológica

### Precauciones

- Púrpura trombocitopénica.
- Enfermedad aguda moderada o grave.
- Reciente administración de sangre y hemoderivados que contienen anticuerpos. Se deben respetar los intervalos sugeridos (ver Recomendaciones Nacionales de Vacunación Argentina 2012).

## Vacuna de campaña: TRIPLE VIRAL (MMRII®)

Es una suspensión de cepas de virus vivos atenuados de sarampión, rubéola y paperas, para reconstituir exclusivamente en su diluyente.

**Dosis:** 0.5 ml

**Vía de administración:** subcutánea.

**Sitio de aplicación:** Parte superior del brazo, región deltoidea o posterior del tríceps.



Una vez reconstituida, la vacuna debe ser utilizada inmediatamente.

Puede administrarse simultáneamente con otras vacunas. De administrarse más de una vacuna, deben aplicarse en sitios anatómicos diferentes.

### Recordar:

En la vacunación sucesiva con vacunas parenterales de virus atenuados, debe observarse un intervalo mínimo de 28 días entre ambas dosis.

## Registro DE VACUNACIÓN EN CAMPAÑA

- Registrar en el carné de vacunación habitual en el espacio destinado a "otros", dejando constancia de que corresponde a la dosis de Campaña, fecha de aplicación, lote y firma.
- Registrar dosis aplicadas en planilla nominal diaria que se consolidará en forma numérica semanalmente.