


FLUJOGRAMA PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE ENFERMEDAD CELÍACA

Extracto de la Guía de práctica clínica sobre diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Celíaca en el primer nivel de atención - aprobada por Resolución Ministerial 561/2011

SI DETECTAMOS LA ENFERMEDAD CELÍACA DE MANERA PRECOZ, EVITAMOS LAS COMPLICACIONES A LARGO PLAZO.



EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE DETECCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD CELÍACA ENTREGA KITS DE ANTITRANSGLUTAMINASA RECOMBINANTE HUMANA IgA A DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS EN TODO EL PAÍS.



Síntomas Típicos

Diarrea Crónica y/o malabsortiva
 • Pérdida de peso
 • Desnutrición
 • Distensión abdominal en niños

Síntomas Atípicos

Anemia • Aftas Orales • Uñas quebradizas
 • Caída de Cabello • Menarca Tardía • Menopausia precoz • Abortos a repetición • Baja estatura • Trastornos en el esmalte dental • Parestesias • Tetania • Fracturas óseas con traumas mínimos • Osteopenia • osteoporosis • Transaminasas • Astenia, cansancio

Grupos de Riesgo

Familiares de 1º y 2º orden • Diabetes tipo I • Déficit selectivo de IgA • Síndrome de Down y de Turner • Síndrome de Sjogren • Tiroiditis de Hashimoto • Hipotiroidismo • Hipertiroidismo
 • Alopecia areata • Psoriasis • Epilepsia • Calcificaciones occipitales • Hepatitis autoinmune • Cirrosis biliar primaria • Artritis reumatoidea • HLA-DQ2/Dq8

SI ATIENDE A UNA PERSONA QUE PADECE UNO O VARIOS SÍNTOMAS DE LOS EXPRESADOS EN LOS LISTADOS, SOLICITE LA REALIZACIÓN DEL ANTICUERPO

PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN:

consultar en www.msal.gov.ar/celiacos (estrategia de detección precoz en APS) o contactarse telefónicamente al (011)4379-9085