

# SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA Y REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN DE FIEBRE AMARILLA SEGÚN LA OMS PARA PAÍSES DE SUDAMÉRICA

Fecha de actualización: 16 de junio 2023



Ministerio de Salud  
Argentina

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN DE FIEBRE AMARILLA SEGÚN LA OMS PARA PAÍSES DE SUDAMÉRICA

A continuación se describe la situación epidemiológica y los requerimientos de inmunización en países de Sudamérica según listado de OMS:

**Bolivia:** en los últimos años se han presentado casos esporádicos en departamentos de La Paz, Cochabamba, Caranavi y Santa Cruz. A junio de este año, hubo 3 casos de fiebre amarilla en los estados Santa Cruz y Beni con un caso de persona fallecida.

### **Vacunación recomendada para las personas viajeras a partir de los 9 meses que se dirijan a las siguientes zonas al este de los Andes por debajo de los 2300 m:**

Todos los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz; y áreas designadas de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Tarija. No recomendado para itinerarios que se limitan a áreas por encima de los 2300 m. y todas las áreas no mencionadas anteriormente, incluidas las ciudades de La Paz y Sucre.

### **Certificado Internacional como requisito de ingreso al país: No requerido**

**Brasil:** en los últimos años se presentaron brotes de fiebre amarilla en las regiones Norte, Medio Oeste, Sudeste y Sur. Entre julio de 2021 y junio de 2022, se notificaron 5 casos confirmados, incluyendo 4 defunciones, en los estados de Pará y Tocantins. A junio de 2023 hubo 4 casos de fiebre amarilla en los estados Amazonas y San Pablo, 2 personas fallecidas.

### **Vacunación recomendada para estados de:**

Amapá, Amazonas, Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Piauí (Oeste y Sur), Mato Grosso, Mato Grosso Do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Río Grande Do Sul, Rondônia, Roraima, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.

### **No se recomienda la vacunación para viajes directos a los estados:**

Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí (Este y Norte), Rio Grande Do Norte e Sergipe.

### **Certificado Internacional como requisito de ingreso al país: No requerido**

**Colombia:** en Colombia para el periodo 2000 a 2019 se han presentado 215 casos, en 59 municipios de 15 departamentos con una tasa de letalidad acumulada del 49,8%. Desde 2006 hasta 2019 se presentaron 29 casos.

### **Vacunación recomendada para personas viajeras de 9 meses o más que tengan como destino de viaje Colombia.**

### ***Generalmente no se recomienda vacunación para viajes a:***

Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. *No recomendado* para itinerarios que se limitan a todas las áreas por encima de los 2300 m., el departamento de San Andrés y Providencia y la ciudad capital de Bogotá.

**Certificado Internacional como requisito de ingreso al país:** las personas viajeras de 1 año o más procedentes de Angola, Brasil, República Democrática del Congo y Uganda y quienes hayan permanecido durante más de 12 horas en un aeropuerto de los países mencionados.

## SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN DE FIEBRE AMARILLA SEGÚN LA OMS PARA PAÍSES DE SUDAMÉRICA

**Ecuador:** a partir del 2000 se interrumpió la aparición de brotes y solo se reportaron casos aislados, el último en el 2017 en la provincia de Sucumbíos (selva amazónica).

**Vacunación recomendada para personas viajeras de 9 meses o más que se dirijan a las siguientes provincias al este de los Andes por debajo de los 2300 m:**

Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora-Chinchipe, y la provincia al oeste de la cordillera, Esmeraldas.

**No recomendada para las ciudades:** Guayaquil, Quito y Galápagos.

**Certificado Internacional como requisito de ingreso al país:** para las personas viajeras de 1 año o más que lleguen de Brasil, República Democrática del Congo y Uganda y quienes hayan transitado por más de 12 horas por un aeropuerto de los países mencionados.

**Perú:** en los últimos años se reportaron casos en los departamentos de Puno, Loreto, Ancash, Junín, San Martín y Ucayali. En el año 2020 fueron dos los países de la Región de las Américas que notificaron casos confirmados de fiebre amarilla: Brasil y Perú. entre la SE 1 y la SE 52 de 2022, se confirmaron 7 casos por laboratorio. Todos tuvieron antecedente de exposición a áreas silvestres y/o boscosas, debido a actividades laborales agrícolas. Los casos fueron notificados en los departamentos de Junín (4 casos), Ucayali (2 casos) y Ayacucho (1 caso). De los 7 casos confirmados y notificados, 5 fallecieron en los departamentos de Junín (3 defunciones) y Ucayali (2 defunciones). Entre la SE 1 y la SE 13 de 2023, se notificaron 4 casos probables de fiebre amarilla, aún bajo investigación.

**Vacunación recomendada para personas viajeras de 9 meses o más que se dirijan a zonas por debajo de los 2300 m. en las regiones de:**

Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Puno, Cusco, Junín, Pasco y Huánuco y con destino a zonas designadas de las siguientes regiones: extremo norte de Apurímac, extremo norte de Huancavelica, extremo nororiental de Ancash, oriente de La Libertad, norte y oriente de Cajamarca, norte y nororiental de Ayacucho y oriente de Piura.

**No recomendada para las ciudades de:** Lima, Cusco, Machu Picchu.

**Certificado Internacional como requisito de ingreso al país:** No requerido

**Paraguay:** no presenta casos de fiebre amarilla desde 2008.

**Vacunación recomendada para personas viajeras de 9 meses o más,** excepto itinerarios que se limitan a la ciudad capital de Asunción.

**Certificado Internacional como requisito de ingreso al país:** Sí, a toda persona que ingrese desde Bolivia, Venezuela, Perú y Brasil independientemente del país de origen.

**Venezuela:** En el 2021 se notificó un brote en personas humanas en el estado de Monagas, con 11 casos de FA confirmados por laboratorio entre las semanas epidemiológicas 39 y 49, sin casos mortales; adicionalmente, se notificaron 13 epizootias confirmadas en primates no humanos, 10 en el estado de Monagas y 3 en el de Anzoátegui.

**Certificado Internacional como requisito de ingreso al país: Sí**, a personas viajeras de 1 año o más procedentes de Brasil y quienes hayan transitado por más de 12 horas en un aeropuerto en Brasil.

**Vacunación recomendada para personas viajeras de 9 meses o más.**

***Generalmente no recomendado*** para viajes cuyos itinerarios se limitan a las siguientes áreas:

todos los estados de Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy, y el Distrito Federal. *No recomendado* para viajes cuyos itinerarios se limiten a las siguientes áreas: todas las áreas por encima de los 2300 m. en los estados de Mérida, Trujillo y Táchira; los estados Falcón y Lara; Isla Margarita; la ciudad capital de Caracas; y la ciudad de Valencia.

**Chile:** no presenta casos de fiebre amarilla.

No se recomienda vacunación.

**Certificado Internacional como requisito de ingreso al país: No requerido**

**Uruguay:** No presenta casos de fiebre amarilla.

No se recomienda vacunación.

**Certificado Internacional como requisito de ingreso al país: No requerido**

### **Recomendaciones generales a los países**

- Inmunización en la población residente de zonas “de transición” respecto al riesgo de transmisión de fiebre amarilla.
- Información e inmunización a personas que viajan hacia zonas donde se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla.
- Fortalecer la vigilancia epidemiológica de fiebre amarilla y otras arbovirosis.

### **Recomendaciones generales para la población residente o que viaja a zonas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla**

- Informarse sobre medidas para prevenir diferentes enfermedades transmisibles.
- Evitar las picaduras de mosquito utilizando ropas claras y de mangas largas y pantalones largos.
- Evitar permanecer en espacios abiertos durante las horas donde hay más mosquitos: desde el atardecer hasta entrada la noche.
- Usar repelente en abundancia y renovar la aplicación especialmente si se estuvo en contacto con agua o si se transpira en abundancia.
- Es caso de usar protector solar, colocarse primero protector solar y luego el repelente.
- Evitar la reproducción de los mosquitos, vaciando todos los envases que acumulan agua.

**Páginas consultadas:**

OPS Alerta Epidemiológica: Fiebre amarilla - 31 de agosto de 2022  
<https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-fiebre-amarilla-31-agosto-2022#:~:text=En%20la%20Regi%C3%B3n%20de%20las,de%20diversa%20magnitud%20es%20a%20lto.>

INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH – 18 NOVEMBER 2022 (REVISED ON 3 JANUARY 2023)  
OMS

[https://cdn.who.int/media/docs/default-source/travel-and-health/vaccination-requirements-and-who-recommendations-ith-2022-country-list.pdf?sfvrsn=be429f2\\_1&download=true](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/travel-and-health/vaccination-requirements-and-who-recommendations-ith-2022-country-list.pdf?sfvrsn=be429f2_1&download=true)

Perfil nacional de fiebre amarilla, Bolivia. OPS 21 diciembre de 2022. Enlace:  
[https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56911/OPSFPLIM0038\\_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56911/OPSFPLIM0038_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Perfil nacional de fiebre amarilla, Brasil. OPS 21 diciembre de 2022. Enlace:  
[https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56904/OPSFPLIM220009\\_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56904/OPSFPLIM220009_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Perfil nacional de fiebre amarilla, Colombia. OPS 21 diciembre de 2022. Enlace:  
[https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56910/OPSFPLIM0039\\_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56910/OPSFPLIM0039_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Boletín de Prensa No 1142 de 2021 Ministerio de Salud y Protección Social  
<https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Fiebre-amarilla,-prevenible-desde-la-vacuna.aspx#:~:text=En%20Colombia%20durante%20el%20periodo,89%2C7%20%25%20fuero%20hombres.>

Perfil nacional de fiebre amarilla, Paraguay. OPS 21 diciembre de 2022. Enlace:  
[https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56906/OPSFPLIM220016\\_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56906/OPSFPLIM220016_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Perfil nacional de fiebre amarilla, Ecuador. OPS 21 diciembre de 2022. Enlace:  
[https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56905/OPSFPLIM220013\\_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56905/OPSFPLIM220013_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Perfil nacional de fiebre amarilla, Argentina. OPS 21 diciembre de 2022. Enlace:  
<https://iris.paho.org/handle/10665.2/56903>

Perfil nacional de fiebre amarilla, Perú. OPS 21 diciembre de 2022. Enlace:  
[https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56907/OPSFPLIM220014\\_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56907/OPSFPLIM220014_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica: Fiebre amarilla, 28 de diciembre de 2021.  
[https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55653/EpiUpdate28Dec2021\\_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=ya](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55653/EpiUpdate28Dec2021_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=ya)

Perfil nacional de fiebre amarilla, Venezuela. OPS 21 diciembre de 2022. Enlace:  
[https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56908/OPSFPLIM220015\\_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56908/OPSFPLIM220015_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y)