

# Enfermedad TROMBOTICA - TROMBOEMBOLICA

DATOS FILATORIOS Y ANTECEDENTES

EDAD  
SEXO  
ANTECEDENTES MEDICOS  
MEDICACION HABITUAL  
FACTORES PREDISONENTES\*

VACUNA

VACUNA:  
FECHA:  
LUGAR DE APLICACIÓN:  
LOTE:  
NUMERO DE DOSIS:

Estudio de ESAVI

Estudio por imágenes \*\*

Se realizara el/los estudio/s mas conveniente de acuerdo al cuadro clínico.

Estudio de posibles neoplasias ocultas

**SEGÚN CORRESPONDA ACORDE A EDAD, SEXO, ANTECEDENTES Y SIGNOSINTOMATOLOGIA** (ovario, páncreas, hígado, cerebro, riñón, pulmón, colon y esófago)

Suero\*\*\*

\*\*\*Guardar muestras para eventuales determinación faltantes.

Hisopado nasofaríngeo

PCR para SARS-CoV-2

Electrocardiograma

Serologías

HIV, sífilis, CMV, EBV.

Fisicoquímico

Hemograma, eritrosedimentación, Proteína C reactiva, GOT, GPT, Bilirrubina total y fraccionada LDH, proteinograma, glucemia, coagulograma, fibrinógeno

Perfil de autoinmunidad

FR, FAN, Complemento, ANCA.

Marcadores Bioquímicos

DIMERO D, Marcadores de disfunción del ventrículo derecho (BNP, NT-proBNP), Marcadores de lesión miocárdica (Troponina T o I).

Estudio de trombofilia

Anticardiolipina IgM e IgG, Inhibidor lúpico, Anti-B2-glicoproteína1, Anticuerpos antifosfolípidos

## \*FACTORES PREDISPONENTE

FUERTES	Fractura (cadera o pierna) en 3 meses previos	
	Prótesis de cadera o rodilla en 3 meses previos	
	Cirugía general mayor en 3 meses previos	
	Traumatismo mayor en 3 meses previos	
	Lesión medular	
MODERADOS	Accesos venosos centrales	
	Cirugía artroscópica de rodilla en 3 meses previos	
	Quimioterapia o T. biológica actual o en 3 meses previos	
	Insuficiencia cardíaca o respiratoria crónicas	
	Terapia de sustitución hormonal	
	Malignidad activa	
	Uso de anticonceptivos orales	
	Accidente cerebrovascular con plejía	
	Embarazo o posparto	
	Tromboembolia venosa previa	
	Trombofilia	
	LEVES	Reposo en cama > 3 días
		Edad > 65 años
Cirugía laparoscópica en 3 meses previos		
Obesidad		
Terreno varicoso		
Inmovilidad por viaje prolongado (auto, avión) en el último mes		

## \*\*ESTUDIOS POR IMAGENES

Ecocardiograma transtorácico o transesofágica

Centellograma de ventilación/perfusión

Tomografía computarizada con protocolo para TEP

Eco-Doppler en la trombosis venosa profunda

Angiorresonancia magnética con protocolo para TEP

Angiografía pulmonar