

ESTUDIO DE PÉRDIDA AUDITIVA NEUROSENSORIAL

DATOS FILATORIOS Y ANTECEDENTES

EDAD
SEXO

ANTECEDENTES MEDICOS

ANTECEDENTES DE RELEVANCIA A CONSIDERAR:

- *Exposición a fármacos con efectos secundarios ototóxicos (antibióticos aminoglucósidos, el cisplatino y los diuréticos de asa.)
- *Exposición al ruido
- * Infecciones, cirugías o traumatismo de oído.
- *Traumatismo de cráneo
- *Enfermedades crónicas (DBT, autoinmune, etc)
- *En infantes: antecedentes de enfermedad perinatal (TORCH)

VACUNA

VACUNA:
FECHA:
LUGAR DE APLICACIÓN:
LOTE:
NUMERO DE DOSIS:

Estudio de ESAVI

Estudio por imágenes

- TAC DE HUESO TEMPORAL
- RMN
- ANGIORMN

ECG

Suero*

*Guardar muestras para eventuales determinación faltantes.

Orina

Sedimento urinario
Orina de 24hs

Hisopado nasofaríngeo

PCR para SARS-CoV-2

Estudios de valoración auditiva

Otoscoopia
Evaluación de la membrana timpánica
Otoscoopia neumática o timpanometría
Prueba de emisiones otoacústicas
Respuesta auditiva del tronco encefálico (ABR) sedado y no sedado
Audiometría
Pruebas de diapason - usando 512 Hz diapason

Serologías

HIV, sífilis,
CMV, EBV,
PAROTIDITIS,
SARAMPION,
RUBEOLA.

Bioquímico

Hemograma, VSG,
Proteína C reactiva,
GOT, GPT, Bilirrubina total y fraccionada
LDH, glucemia, coagulo grama, fibrinógeno, HB1AC., glucemia, perfil tiroideo, urea, creatinina.

Perfil de autoinmunidad

FAN
ANCA
LATEX AR
Complemento (c3 y c4)
Ig E / rto de eosinofilos
Proteinograma
Crioglobulinas

Metabólico y toxicidad

Vitamina B12
Cobre
Plomo