


**Algoritmo para evaluar el establecimiento del CoPaP y monitoreo de la Primera Hora de Vida**



\* RAPP: Respiración - Actividad - Perfusión - Posición/tono.

\*\* Motivo por el que no alcanza el estándar: \_\_\_\_\_

**Documentación del CoPaP y el inicio de la lactancia, y monitoreo de la Primera Hora de Vida**

Nombre y apellido ..... DNI .....

Ligadura de cordón: ..... min ..... seg CoPaP inicio: ..... hs ..... min CoPaP finalización: ..... hs ..... min

Puntaje de Apgar: Al minuto 1: ..... Al minuto 5: ..... Pulseras de identificación:  Sí  No

Acompañante:  Sí  No Vía de nacimiento:  parto vaginal  cesárea

RAPP		5 minutos	15 minutos	30 minutos	45 minutos	60 minutos
¿RESPIRA sin dificultad?	SÍ	<input type="checkbox"/>				
	NO	<input type="checkbox"/>				
ACTIVIDAD 9 Etapas de Windström	Llanto	<input type="checkbox"/>				
	Reposo	<input type="checkbox"/>				
	Despertar	<input type="checkbox"/>				
	Actividad	<input type="checkbox"/>				
	Descanso	<input type="checkbox"/>				
	Arrastre	<input type="checkbox"/>				
	Familiarización	<input type="checkbox"/>				
	Succión	<input type="checkbox"/>				
	Sueño	<input type="checkbox"/>				
PERFUSIÓN ¿Rosada/o?	SÍ	<input type="checkbox"/>				
	NO	<input type="checkbox"/>				
POSICIÓN / TONO ¿Posición correcta?	SÍ	<input type="checkbox"/>				
	NO	<input type="checkbox"/>				

Posición: Prono, cabeza lateralizada, cara visible, vía aérea recta, fosas nasales y boca libres, posición de olfateo, miembros flexionados. Compresa que cubra el cuerpo, pero no la cara.

**DEFINICIONES:**

CoPaP inmediato: la persona recién nacida es colocada sobre la piel de la puérpera luego del expulsivo, antes de la ligadura del cordón umbilical.

CoPaP continuo: El CoPaP persiste desde el expulsivo hasta la finalización de la ingesta de calostro.

CoPaP ininterrumpido: El CoPaP y el despliegue motor de la persona recién nacida no recibe interferencias o intervenciones externas, de la familia o del equipo de salud.